

猕猴桃花期提前防病用肥须跟紧

“今年春季温度上升快，预计今年的猕猴桃花期会提前，一定要提前做好授粉准备工作。”4月6日，蒲江县产业发展专家、科技特派员许兴伟走进大兴镇炉坪村猕猴桃园，现场对农户进行技术指导。3月中旬以来，蒲江县气温飙升明显，日最高气温均打破历史同期值，最高气温已达30℃左右，较往年同期偏高10.3℃，为近年来罕见。异常高温将往年的清明节后的花期提前到3月底至4月初，预计今年猕猴桃谢后的病虫害防治工作将会较往年有所提前。许兴伟提醒：猕猴桃谢花后的管理非常重要，要做到及时防病，科学用肥。及时防病。猕猴桃全部谢花后，一般在花瓣脱落后5~7天，要选择安全的药剂防控细菌性病害、溃疡病、灰霉病等，炭疽病要辅以杀虫剂进行防控。猕猴桃谢花后的第一次喷施用药中，叶面营养剂的使用也是少不了的，建议用碧护10000~15000倍喷雾，这样更有利于猕猴桃树特别是幼果的生长。科学施肥。当猕猴桃幼果转青绿色时，选用高氮高钾型水溶肥配合有机水溶肥，做好钙、镁、锌、硼、钼补充，根据土壤质量适量施肥。在这个时间段，要注意根据果园内土壤的墒情，在施用肥料时合理浇灌水。许兴伟告诉记者，猕猴桃谢花后的管理工作并不难，只要掌握好种植技术，按照正常的生长特性科学种植就行，不要急于求成，以免因一时疏忽造成巨大损失。来源：四川农村日报 编辑：牛姣

[下载本文pdf文件](/pdf/20888-猕猴桃花期提前防病用肥须跟紧.pdf)